

**EINIGE MADAGASSISCHE STRATIOMYIDEN
DES MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS**

VON ERWIN LINDNER *

SARGINAE

Chrysochroma australe Big.

3 ♂♂ von Ivondro, 5. — VII.1940, SEYRIG.

Chrysochroma pecticooides Lind., 1966

1 ♂ von Ivondro, VII.1940, SEYRIG.

Chrysochroma fortunatum Lind.

1 ♂ von Ivondro, VII.1940, SEYRIG.

Ein tadellos erhaltenes Stück; es unterscheidet sich von meiner Beschreibung nur durch stärkere Verdunkelung. So sind die Pleural- und Sternalgegend nicht chitin-rotgelb, sondern glänzend dunkelbraun und das Abdomen ist dunkel broncefarbig mit violetterm Schimmer, besonders an der Basis. Das gelbe Randmal ist schmal; r_{2+3} liegt wenig distal des Endes von D. R_3 ist wenig länger als R_4 . Die Farbunterschiede zwischen dem Typus und diesem Stück dürften auf verschiedenen Reifezustand zurückzuführen sein.

Chrysochroma vadoni Lind., 1966 (♂ ♀)

1 ♂ von Ivondro, V.1940, SEYRIG.

Diese Art hat mit *Ch. nigricoxum* gemeinsam die geteilten Augen, sowie die kurze und dichte unterseitige Behaarung der Tarsen. ♂: Kopf schwarz. Stirn in der Mitte so breit wie ein Ocellus; vorne wie das Untergesicht bräunlich; die Stirnblase weiss, durch eine Längsspalte geteilt. Fühler rotgelb, mit schwarzer Beborstung der Basalglieder, schwarzer, an der Basis brauner Fühlerborste. Rüssel chitinfarben. Mesonotum und Schildchen dunkel violett, fast schwarz; das Schildchen mit rotgelbem Rand. Schulter, Pronotum, Pleuren rötlichbraun mit dunkelbrauner Fleckung, besonders auf dem Propleuren. Flügel apikal grau, Adern dunkelbraun. R_3 doppelt so lang wie R_4 . Randmal schmal chitinfarben. Schwinger grün. p rötlich chitinfarben. Die f_2 und f_3 braun, an Basis und Ende etwas heller. p_1 hell chitinfarben. t_3 in der Basalhälfte braun, in der Apikalhälfte hellgelb. Tarsen rötlichbraun mit heller Beborstung. p_3 braun mit heller, glänzender Beborstung, besonders der Tarsen. Auf der Unterseite der

* Ergänzung zu meiner Arbeit Nr. 190 in den Stuttgarter Beiträgen zur Naturkunde,

Metatarsen besonders von p^1 und p_3 die dichte starke Beborstung, deren Länge fast gleich der Dicke des Metatarsus ist. Abdomen rötlich braun, die letzten Segmente fast schwarz, das erste Tergit mit hellgrünem Hinterrand, das zweite mit schwarzbraunen diffus begrenzten Seitenflecken. — 9 mm.

STRATIOMYINAE

Odontomyia bipunctata Big.

1 ♂, Bekily, Rég. sud de l'île, IX.1940, SEYRIG.

Odontomyia herbacea Lind.

1 ♀, Ranomafana, II.1940, SEYRIG.

CLITELLARIINAE

Heraclina madagassica Lind.

1 ♀, Bekily, Rég. sud de l'île, X.1940, SEYRIG.

Beschrieben, 1966, S. 14. Stimmt mit dem Typus überein. Ergänzung : die Fühler sind braunrot, die Basalglieder hellgelb. Fühlerborste hell bräunlich.

PACHYGASTERINAE

Leucacron interruptum Lind.

1 ♀ von Ivondro, VI.1940, SEYRIG.